

GELBFIEBER-IMPFEMPFEHLUNGEN 2013 (nach WHO ITH 2012, CDC YELLOW BOOK 2014)

	IMPFERFORDERNIS	IMPFEMPFEHLUNG
AFGHANISTAN		keine
ÄGYPTEN	≥1a, bei Einreise aus Sudan: Impfzertifikat oder Lokalisationszertifikat (nicht südl des 15°N) innerhalb der letzten 6 Tage	keine
ALBANIEN	≥1a	keine
ALGERIEN	≥1a, inkl. Flughafentransit >12h in YF- Risikogebiet	keine
ANGOLA	≥1a	generelle Impfempfehlung
ANGUILLA	≥1a, inkl. Flughafentransit	keine
ANTIGUA/BARBUDA	≥1a	keine
ÄQUATORIAL-GUINEA		generelle Impfempfehlung
ARGENTINIEN		Empfehlung für alle Reisenden ≥ 9 Monate für die nördl. und nordöstl. Waldgebiete unter 2300m in den Grenzgebieten zu Brasilien und Paraguay: Misiones (alle Departments) und Corrientes (Berón de Astrada, Capital, General Alvear, General Paz, Ituzaingó, Itatí, Paso de los Libres, San Cosme, San Martín, San Miguel Santo Tomé), inkl.. Wasserfälle von Iguazu
		generell nicht empfohlen für Reisende in die folgenden Provinzen unter 2300m: Formosa (all departments), Chaco (Bermejo) Jujuy; (Ledesma, San Pedro, Santa Bárbara, Valle Grande), and Salta (Anta, General José de San Martín, Oran, Rivadavia)
		nicht empfohlen für Reisende in Höhenlagen über 2300m und in die nicht angeführten Provinzen und Departments
ARUBA	≥ 6Mo	keine
ÄTHIOPIEN	≥1a	für alle Reisenden ≥ 9 Monate, außer unten angeführte Gebiete
		generell nicht empfohlen für Reisende in die Provinzen Afar und Somali

GELBFIEBER-IMPFPFEMPFEHLUNGEN 2013 (nach WHO ITH 2012, CDC YELLOW BOOK 2014)

	IMPFERFORDERNIS	IMPFPFEMPFEHLUNG
AUSTRALIEN	≥1a, wenn innerhalb der letzten 6 Tage über Nacht oder länger in YF-Gebiet, inkl. Sao Tome, Somalia, Tanzania, jedoch außer: Galapagos in Ecuador, Misiones in Argentinien	keine
BAHAMAS	≥1a, inkl. Flughafentransit >12h in YF-Risikogebiet	keine
BAHRAIN	≥1a	keine
BANGLADESH	≥1a	keine
BARBADOS	inkl. Flughafentransit >12h in YF-Risikogebiet, außer Guyana sowie Trinidad und Tobago	keine
BELIZE	≥1a	keine
BENIN	≥1a	generelle Impfpfempfehlung
BHUTAN	inkl. Flughafentransit	keine
<u>BOLIVIEN</u>	≥1a	Empfehlung für alle Reisenden ≥ 9 Monate in folgende Gebiete östlich der Anden in Höhen unter 2300m: Departments Beni, Pando und Santa Cruz, und bestimmte Gebiete von of Chuquisaca, Cochabamba, La Paz und Tarija nicht empfohlen für Reisende in Gebiete über 2300m und alle nicht angeführten Gebiete inkl.. die Städte La Paz und Sucre
BOTSWANA	≥1a, inkl. Durchreise und Flughafentransit >12h in YF-Risikogebiet	keine

GELBFIEBER-IMPFFEMPFEHLUNGEN 2013 (nach WHO ITH 2012, CDC YELLOW BOOK 2014)

	IMPFFERFORDERNIS	IMPFFEMPFEHLUNG
<u>BRASILIEN</u>		Empfehlung für alle Reisenden ≥ 9 Monate in folgende Gebiete: die Staaten Acre, Amapá, Amazonas, Distrito Federal (inkl. Hauptstadt Brasília), Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Rondônia, Roraima und Tocantins, und regional in den Staaten Bahia, Paraná, Piauí, Rio Grande do Sul, Santa Catarina and São Paulo. Impffempfehlung auch für die Wasserfälle von Iguazu
		nicht empfohlen für Reisende in nicht angeführte Gebiete, inklusive der Städte Fortaleza, Recife, Rio de Janeiro, Salvador und Sao Paulo
BRUNEI	$\geq 1a$, inkl. Flughafentransit $>12h$ in YF-Risikogebiet	keine
BURKINA FASO	$\geq 1a$	generelle Impffempfehlung
BURUNDI	$\geq 1a$	generelle Impffempfehlung
CAP VERDE	$\geq 1a$	keine
CHINA	≥ 9 Mo, inkl. Flughafentransit in YF-Risikogebiet	keine
CHRISTMAS ISLAND	wie Australien	keine
COSTA RICA	>9 Mo inkl. Flughafentransit $>12h$ in YF-Risikogebiet, außer Argentinien, Panama und Trinidad/Tobago	keine
DEM. REP. KONGO	$\geq 1a$	Empfehlung für alle Reisenden ≥ 9 Monate mit Ausnahme der unten angeführten Regionen
		generell nicht empfohlen für Reisende in die Provinz Katanga
DJIBOUTI	$\geq 1a$	keine
DOMINICA	$\geq 1a$, inkl. Flughafentransit $>12h$ in YF-Risikogebiet	keine

GELBFIEBER-IMPFFEMPFEHLUNGEN 2013 (nach WHO ITH 2012, CDC YELLOW BOOK 2014)

	IMPFFERFORDERNIS	IMPFFEMPFEHLUNG
ECUADOR	≥1a, Impfzertifikat (Nationals, Residents) bei Ausreise in Gelbfieberrisikogebiete erforderlich	Empfehlung für alle Reisenden ≥ 9 Monate unter 2300m in Provinzen östlich der Anden: Morona- Santiago, Napo, Orellana, Pastaza, Sucumbios und Zamora-Chinchipe
		generell nicht empfohlen für Reisende in Höhenlagen <2300m in folgende Provinzen westlich der Anden: Esmeraldas, Guayas, Los Rios, Manabi und bestimmte Gebiete von Azuay, Bolivar, Canar, Carchi, Chimborazo, Cotopaxi, El Oro, Imbabura, Loja, Pichincha und Tungurahua
		nicht empfohlen für Reisende in Höhenlagen >2300m, die Städte Guayaquil, Quito sowie die Galapagos-Inseln
EL SALVADOR	1-60a	keine
ELFENBEINKÜSTE	≥1a	generelle Impffempfehlung
ERITREA		generell nicht empfohlen für Reisende nach Anseba, Debub, Gash Barka, Mae Kel and Semenawi Keih Bahri.
		nicht empfohlen für Reisende in alle nicht angeführten Regionen und die Inseln des Dahlak Archipelagos
FIDSCHI	≥1a, inkl. Flughafentransit >12h in YF-Risikogebiet	keine
FR.GUYANA	≥1a	generelle Impffempfehlung
GABUN	≥1a	generelle Impffempfehlung
GAMBIA	≥1a	generelle Impffempfehlung
GHANA	≥ 9 Mo	generelle Impffempfehlung
GRENADA	≥1a, inkl. Flughafentransit >12h in YF-Risikogebiet	keine
GUADELOUPE	≥1a	keine
GUATEMALA	≥1a	keine
GUINEA	≥1a	generelle Impffempfehlung

GELBFIEBER-IMPFFEMPFEHLUNGEN 2013 (nach WHO ITH 2012, CDC YELLOW BOOK 2014)

	IMPFERFORDERNIS	IMPFFEMPFEHLUNG
GUINEA-BISSAU	≥1a	generelle Impffempfehlung
GUYANA	≥1a, außer Argentinien, Paraguay, Surinam, Trinidad/Tobago	generelle Impffempfehlung
HAITI		keine
HONDURAS	≥1a, inkl. Flughafentransit >12h in YF-Risikogebiet, außer Panama	keine
INDIEN	inkl. Transit (außer nur Flughafen)	keine
INDONESIEN	≥ 9Mo	keine
IRAK		keine
IRAN		keine
JAMAICA	≥1a, inkl. Flughafentransit	keine
JEMEN	≥1a	keine
JORDANIEN	≥1a	keine
KAMBODSCHA	≥1a, inkl. Flughafentransit >12h in YF-Risikogebiet	keine
KAMERUN	≥1a	generelle Impffempfehlung
KASACHSTAN		keine
KENYA	≥1a	Empfehlung für alle Reisenden ≥ 9 Monate außer in die unten angeführten Regionen generell nicht empfohlen für Reisende in folgende Regionen: die gesamte North Eastern Province, die Staaten Kilifi, Kwale, Lamu, Malindi und Tanariver in der Coastal Province und die Städte Nairobi und Mombasa
KIRGISISTAN	≥1a, inkl. Flughafentransit >12h in YF-Risikogebiet	keine

GELBFIEBER-IMPFEMPFEHLUNGEN 2013 (nach WHO ITH 2012, CDC YELLOW BOOK 2014)

	IMPFERFORDERNIS	IMPFEMPFEHLUNG
KIRIBATI	≥1a	keine
KOLUMBIEN		Empfehlung für alle Reisende ≥ 9 Monate in folgende Regionen unter 2300m: Amazonas, Antioquia, Arauca, Atlántico, Bolivar, Boyacá, Caldas, Caquetá, Casanare, Cauca, Cesar, Choco (nur Acandi, Juradó, Riosucio, Unguía), Córdoba, Cundinamarca, Guainía, Guaviare, Huila, La Guajira (nur die Gemeinden Albania, Barrancas, Dibulla, Distracción, El Molino, Fonseca, Hatonuevo, La Jagua del Pilar, Maicao, Manaure, Riohacha, San Juan del Cesar, Urumita und Villanueva), Magdalena, Meta, Norte de Santander, Putumayo, Quindio, Risaralda, San Andrés und Providencia, Santander, Sucre, Tolima, Vaupés, Vichada
		generell nicht empfohlen für Reisende in Regionen westlich der Anden in Höhenlagen unter 2300m: Departments Cauca, Nariño und Valle de Cauca, central and southern Choco, die Städte Barranquilla, Cali, Cartagena und Medellín
		nicht empfohlen für Reisende in Regionen mit Höhenlagen über 2300m inkl.. der Stadt Bogota und die Gemeinde Uribia im La Guajira-Department
KONGO	≥1a	generelle Impfempfehlung
KOREA/VR	≥1a	keine
LAOS		keine
LESOTHO	≥ 9Mo, inkl. Flughafentransit >12h in YF-Risikogebiet	keine
LIBANON	≥ 6 Mo	keine
LIBERIA	≥1a	generelle Impfempfehlung
LIBYEN		keine
MADAGASKAR		keine
MALAWI	≥1a, inkl. Flughafentransit >12h in YF-Risikogebiet	keine

GELBFIEBER-IMPFEMPFEHLUNGEN 2013 (nach WHO ITH 2012, CDC YELLOW BOOK 2014)

	IMPFERFORDERNIS	IMPFEMPFEHLUNG
MALAYSIA	≥1a, inkl. Flughafentransit >12h in YF-Risikogebiet	keine
MALEDIVEN	≥1a	keine
MALI	≥1a	Empfehlung für alle Reisenden ≥ 9 Monate in Regionen südlich der Sahara nicht empfohlen für Reisende ausschließlich in die Sahara
MALTA	≥ 9 Mo, jedoch nicht bei Flughafentransit	keine
MARTINIQUE		keine
MAURETANIEN	≥1a	Empfehlung für alle Reisenden ≥ 9 Monate in Regionen südlich der Sahara nicht empfohlen für Reisende ausschließlich in die Sahara
MAURITIUS	≥1a, inkl. Flughafentransit >12h in YF-Risikogebiet	keine
MAYOTTE	≥1a	keine
MONTSERRAT	≥1a	keine
MOZAMBIQUE	≥1a	keine
MYANMAR	≥1a, inkl. Flughafentransit >12h in YF-Risikogebiet	keine
NAMIBIA	≥1a	keine
NAURU	≥1a	keine
NEPAL		keine
NEUKALEDONIEN	≥1a	keine
NICARAGUA	≥1a	keine
NIEDERL. ANTILLEN	≥ 6 Mo	keine
NIGER	≥1a	Empfehlung für alle Reisenden ≥ 9 Monate in Regionen südlich der Sahara nicht empfohlen für Reisende ausschließlich in die Sahara
NIGERIA	≥1a	generelle Impfempfehlung

GELBFIEBER-IMPFEMPFEHLUNGEN 2013 (nach WHO ITH 2012, CDC YELLOW BOOK 2014)

	IMPFERFORDERNIS	IMPFEMPFEHLUNG
NIUE	≥ 9 Mo	keine
NORFOLK INSELN	wie Australien	keine
OMAN	≥1a	keine
OSTTIMOR	≥1a	keine
PAKISTAN	≥ 9 Mo, inkl. Flughafentransit >12h in YF-Risikogebiet	keine
PALAU		keine
PANAMA		Empfehlung für alle Reisenden ≥ 9 Monate aufs Festland östlich der Kanalzone, (alle comarcas von Emberá und Kuna Yala, die Provinz Darién und Teile der Provinzen Colón and Panama, die östlich der Kanalzone liegen)
		nicht empfohlen für Reisende in Provinzen westlich der Kanalzone, nach Panama-City, die Kanalzone und die Inseln Balboa and San Blas
PAPUA-NEUGUINEA	≥1a	keine
PARAGUAY	≥1a	Empfehlung für alle Reisenden ≥ 9 Monate, außer in die unten angeführten Gebiete
		generell nicht empfohlen für Reisende in die Stadt Asuncion
PERU		Empfehlung für alle Reisenden ≥ 9 Monate in folgende Gebiete < 2300m: Amazonas, Loreto, Madre de Dios, San Martin und Ucayali sowie bestimme Gebiete folgender Regionen: NO v. Ancash; N-Apurímac; N und NO-. Ayacucho; N- und O-Cajamarca; NW-, N- u. NO- Cusco; N-Huancavelica; N-, Zentral- und O-Huánuco; N- u. O-Junín; O-La Libertad; Zentral- und O-Pasco; O- Piura u. N-Puno.
		generell nicht empfohlen für folgende Gebiete westlich der Anden: Lambayeque und Tumbes sowie bestimmte Gebiete von W-Piura und West-Zentral-Cajamarca.
		nicht empfohlen für alle Gebiete über 2300m, die nicht angeführten Regionen westlich der Anden sowie für die Städte Cuzco und Lima, Machu Picchu und den Inka-Trail

GELBFIEBER-IMPFE MPFEHLUNGEN 2013 (nach WHO ITH 2012, CDC YELLOW BOOK 2014)

	IMPFERFORDERNIS	IMPFE MPFEHLUNG
PHILIPPINEN	≥1a, inkl. Flughafentransit >12h in YF-Risikogebiet	keine
PITCAIRN	≥1a	keine
RÉUNION	≥1a	keine
RUANDA	≥1a	generelle Impfempfehlung
SALOMONEN		keine
SAMBIA	≥ 9 Mo, inkl. Flughafentransit >12h in YF-Risikogebiet	generell nicht empfohlen für Reisende in die North Western und Western Provinces
		nicht empfohlen für alle nicht angeführten Gebiete
SAMOA	≥1a	keine
SAO TOMÉ & PRIN.	≥1a	generell nicht empfohlen für Reisende nach Sao Tome & Principe
SAUDIARABIEN		keine
SENEGAL	≥ 9 Mo, inkl. Flughafentransit >12h in YF-Risikogebiet	generelle Impfempfehlung
SEYCHELLEN	≥1a, inkl. Flughafentransit >12h in YF-Risikogebiet	keine
SIERRA LEONE		generelle Impfempfehlung
SIMBABWE		keine
SINGAPUR	≥1a, inkl. Flughafentransit >12h in YF-Risikogebiet	keine
SOMALIA		generell nicht empfohlen für Reisende in folgende Regionen: Bakool, Banaadir, Bay, Gado, Galgadud, Gedo, Hiiraan, Lower Jubada, Middle Jubada, Lower Shabelle und Middle Shabelle
		nicht empfohlen für alle nicht angeführten Gebiete
SRI LANKA	≥1a	keine
ST. HELENA	≥1a	keine

GELBFIEBER-IMPFEMPFEHLUNGEN 2013 (nach WHO ITH 2012, CDC YELLOW BOOK 2014)

	IMPFERFORDERNIS	IMPFEMPFEHLUNG
ST. KITTS & NEVIS	≥1a, inkl. Flughafentransit >12h in YF-Risikogebiet	keine
ST. LUCIA	≥1a	keine
ST. PIERRE/MIQUELON		keine
ST. VINC./GRENAD.	≥1a	keine
SÜDSUDAN	????	generelle Impfempfehlung
SÜDAFRIKA	≥1a, inkl. Flughafentransit, gilt auch für Eritrea, Sao Tomé und Príncipe, Somalia, Tanzania, Zambia	keine
SUDAN	≥ 9 Mo, Impfzertifikat kann bei Ausreise erforderlich sein	Impfempfehlung für Reisende ≥ 9 Monate in Gebiete südlich der Sahara nicht empfohlen für Reisende in die Sahara und die Stadt Khartoum
SURINAM	≥1a	generelle Impfempfehlung
SWAZILAND		keine
SYRIEN	≥6 Mo, inkl. Flughafentransit >12h in YF-Risikogebiet	keine
TANZANIA	≥1a	generell nicht empfohlen für Reisende nach Tanzania, Impfpflicht bei Einreise nach Sansibar?
THAILAND	≥1a, inkl. Flughafentransit >12h in YF-Risikogebiet	keine
TOGO	≥1a	generelle Impfempfehlung
TRINIDAD/TOBAGO	≥1a	Impfempfehlung für Reisende ≥ 9 Monate nach Trinidad, außer unten angeführte Gegebenheiten
		generell nicht empfohlen für Reisende in die Stadtgebiete von Port of Spain, Kreuzfahrtpassagiere, die das Schiff nicht verlassen und für Flughafentransitpassagiere
		nicht empfohlen für Reisende nach Tobago

GELBFIEBER-IMPFPFEMPFEHLUNGEN 2013 (nach WHO ITH 2012, CDC YELLOW BOOK 2014)

	IMPFFERFORDERNIS	IMPFPFEMPFEHLUNG
TSCHAD		Impfpfempfehlung für Reisende ≥ 9 Monate in Gebiete südlich der Sahara
		nicht empfohlen für Reisende in die Sahara
TUNESIEN	≥1a	keine
TURKS & CAICOS	≥1a	keine
UGANDA	≥1a	generelle Impfpfempfehlung
URUGUAY		keine
VENEZUELA		Impfpfempfehlung für Reisende ≥ 9 Monate außer unter den unten angeführten Bedingungen
		generell nicht empfohlen für Reisende in folgende Regionen: Aragua, Carabobo, Miranda, Vargas und Yaracuy und Distrito Federal
		nicht empfohlen für Reisende nach: Falcón, Lara, Paez Municipality (Halbinsel in der Prov. Zulia), Isla Margarita, die Städte Caracas und Valencia
VIETNAM	≥1a	keine
ZENTRALAFRIKAN. REP.	≥9 Mo	generelle Impfpfempfehlung

	Gelbfieberimpfvorschrift bei Einreise aus Endemiegebiet
	Gelbfieberimpfvorschrift bei Einreise aus Endemiegebiet, auch bei Flughafentransit > 12 Stunden
	Gelbfieberimpfvorschrift bei Einreise aus Endemiegebiet, IMPFPFEMPFEHLUNG FÜR DEN REISENDEN
	keine Impfvorschrift im int. Reiseverkehr, IMPFPFEMPFEHLUNG FÜR DEN REISENDEN
	Gelbfieberimpfvorschrift für alle Reisenden